

## The application of Mixture Cure models in the data analysis of the elderly injured due to collapse

Ali Gholami<sup>1</sup>, Enayatollah Bakhshi<sup>2</sup>, \*Mehdi Rahgozar<sup>3</sup>

Author Address

1. MSc in Biostatistics, Biostatistics Department, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran;  
 2. PhD in Biostatistics, Biostatistics Department, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran;  
 3. PhD in Biostatistics, Biostatistics Department, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran.  
 \*Corresponding Author's Address: University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran;

\*Tel: 09128168781; \*Email: m\_rahgozar2003@yahoo.com.au

Received: 2016 January 24; Accepted: 2016 February 29.

**Abstract**

**Objective:** Mixture Cure Models have been developed to analyze failure time data with a cured fraction. For such data, standard survival models are usually not appropriate because they do not account for the possibility of treatment. Mixture cure models assume that the studied population is a mixture of susceptible individuals who may experience the event of interest, and non-susceptible individuals that will never experience it. This study aimed to apply mixture cure models to analyze the elderly injured due to fall (collapsing) and to discover factors (such as age, blood pressure and ...) on their cure rate or death rate.

**Methods:** This study compromises all the elderly injured due to fall in Qom County which their historical health files were available in Health Management Information System from 2010 to 2012. Follow up study was conducted through Civil Registration Organization data bases 3 years later and totally 124 cases were selected for analysis. Then, we fitted semi-parametric PH mixture cure model and semi-parametric AFT mixture cure model to the elderly injured due to fall by means of R package and we compared the results.

**Results:** The sample consists of 44 percent men and 56 percent women. 43 percent of this population had one operation, 16 percent had diabetes, 31 percent had blood pressure and about 52 percent had injured head and neck. Fitting semi parametric AFT mixture cure model revealed that age ( $p=0.016$ ) statistically influenced on cure probability and injured neck and head ( $p=0.031$ ) and diabetes variable ( $p=0.080$ ) influenced on failure time probability.

**Conclusion:** This study revealed that neck and head injury of the elderly has significant influence on their death probability. Therefore, injuries due to fall (collapse) can be decreased by improving living conditions of the elderly. Furthermore, nutrition control can be used to minimize impacts of diabetes disease. Results indicate that we can use both PH and AFT semi-parametric mixture cure model for estimating the injured elderly due to fall data.

**Keywords:** Proportional Hazard Model, Accelerated Failure Time Model, Semi-Parametric Mixture Cure Model.

## کاربرد مدل شفایافتگی آمیخته در تحلیل داده‌های سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط

علی غلامی چکوسری<sup>۱</sup>، عنايت‌الله بخشى<sup>۲</sup>، \*مهدى رهگذر<sup>۳</sup>

توضیحات نویسنده‌گان

۱. فرقانیس آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
۲. دانشوار و متخصص آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
۳. دانشوار و متخصص آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.  
آدرس نویسنده مسئول: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آمار زیستی:  
تلفن: ۰۹۱۲۴۱۶۸۷۸۱؛ \*ایمیل: m\_rhgozar2003@yahoo.com.au

تاریخ دریافت: ۴ بهمن ۱۳۹۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

### چکیده

**هدف:** مدل شفایافتگی آمیخته نوع خاصی از مدل‌های بقا است و در آن فرض می‌شود که جامعه مورد بررسی آمیخته‌ای از افراد مستعد برای تجربه رویداد مورد نظر و شفایافتگان (افراد نامستعد) که هرگز رویداد مورد نظر را تجربه نمی‌کنند، می‌باشد. برای چنین داده‌هایی مدل‌های استاندارد بقا معمولاً مناسب نیستند زیرا در آن‌ها امکان شفایافتگی در نظر گرفته نمی‌شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر عواملی مانند سن، دیابت، صدمه به سر و گردن و ... بر شفایافتگی یا فوت و سپس برآورده نرخ این دو شاخص در سالمدان دارای صدمات ناشی از سقوط است. بدین‌منظور پس از سقوط سالمدان و مراجعة وی به بیمارستان، عوامل فوق اندازه‌گیری شده و پس از پیگیری وضعیت (شفایافتگی یا مرگ)، میزان شفایافتگی و فوت محسابه شده است: به عنوان مثال نرخ فوت در سالمدانی که دارای بیماری دیابت هستند با افرادی که دارای این بیماری نیستند، مقایسه شده است.

**روش بررسی:** در این مطالعه از داده‌های تمامی سالمدانی که به علت سقوط صدمه دیده بودند و پرونده پژوهشکی آن‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در بیمارستان شهرستان قم موجود بود، استفاده شد. در ادامه، با پیگیری از اداره ثبت احوال، وضعیت مرگ یا زندگی آن‌ها ثبت شد. تاریخی‌بیشتر ماه ۹۴ (به فاصله زمانی حداقل سه‌ماه و حداقل شش سال پس از سقوط)، در کل؛ ۱۲۴ مورد برای تحلیل، استفاده شد. برای تحلیل از مدل‌های شفایافتگی آمیخته نیمه‌پارامتری خطر متناسب و مدل‌های شفایافتگی آمیخته شتابی زمان شکست برای داده‌های سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط استفاده شد و نتایج مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار R نسخه ۳-۲-۲ استفاده شد.

**یافته‌ها:** از نمونه‌های بررسی شده، ۵۴ نفر از سالمدان، مرد (۴۴ درصد) و ۷۰ نفر از آن‌ها زن (۵۶ درصد) بودند. تعداد ۲۰ نفر (۱۶ درصد) دارای سابقه بیماری قند و ۳۹ نفر (۳۱ درصد) دارای پُرفشاری خون و تعداد ۶۴ نفر (۵۲ درصد) دارای صدمه به سر و گردن و تعداد ۴۸ نفر (۴۳ درصد) دارای یک موضع جراحی شده بودند. برآزش مدل چندمتغیره برای شفایافتگی آمیخته زمان شکست شتابی نیمه‌پارامتری نشان داد متغیر سن بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار است ( $p=0.016$ ) و سایر متغیرها بر شفایافتگی تأثیرگذار ندارند. برای فوت شدگان، متغیر صدمه به سروگرد (head neck) (b) و متغیر دیابتی بودن (b) (age = ۰/۰۳۹,  $p=0.0016$ ) (diabetic = ۰/۰۸۰,  $p=0.000155$ ) بر احتمال فوت تأثیرگذار بود.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به اینکه صدمه به سروگردن یکی از عوامل مؤثر بر فوت سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط بوده است، به نظر می‌رسد با بهبود شرایط مکان زندگی سالمدان، می‌توان آسیب‌های ناشی از سقوط را کاهش داد. علاوه‌بر این، با کنترل تغذیه سالمدان می‌توان آسیب‌های ناشی از بیماری‌هایی مانند قند را به حداقل رساند. هم‌چنین هر دو روش شفایافتگی آمیخته خطر متناسب و روش زمان شکست شتابیه دارای مدل شفایافتگی آمیخته نیمه‌پارامتری داده‌های سالخوردگان ناشی از سقوط است.

**کلیدواژه‌ها:** مدل خطر متناسب، مدل زمان شکست شتابی، مدل شفایافتگی آمیخته نیمه‌پارامتری.

## ۱ مقدمه

تخصیم می‌شوند: مهم‌ترین عوامل داخلی سقوط شامل کم‌تحرکی، اختلال شناختی، مصرف دارو، افسردگی، سرگیجه، ترس از سقوط، و مهم‌ترین عوامل خارجی، خطر سُرخوردن در منزل، عدم وجود دستگیره یا نرده و روشنایی کم است. بسیاری از این عوامل قابل پیشگیری هستند (۳۰).

علاوه بر مدل‌های استاندارد بقا، یکی از مدل‌هایی که می‌تواند در تحلیل داده‌های سالماندان صدمه‌دیده ناشی از سقوط مورداستفاده قرار گیرد، مدل شفایافتگی آمیخته است. مدل‌های شفایافتگی، برای تحلیل داده‌های زمان شکست باکسری از بیماران شفایافتیه ایجاد شده‌اند. برای چنین داده‌هایی، مدل‌های استاندارد بقا مناسب نیستند زیرا در این مدل‌ها امکان شفایافتگی یا بهبود در نظر گرفته نمی‌شود (۳۱).

سقوط سالماندان می‌تواند یکی از علل مرگ و میر آنان باشد اما نسبت شفایافتگی در بین سالماندان صدمه‌دیده ناشی از سقوط، قابل توجه است. از این دیدگاه می‌توان صدمات ناشی از سقوط سالماندان را در قالب مدل‌های شفایافتگی تحلیل کرد.

در مدل‌های شفایافتگی آمیخته، فرض بر این است که جامعه موردمطالعه ترکیبی از اشخاص مستعد که پیش‌آمد موردنظر را تجربه می‌کنند و افراد نامستعد که هیچ‌گاه پیش‌آمد موردنظر را تجربه نخواهند کرد، می‌باشد. مسئله مهم در مدل‌های شفایافتگی آمیخته، برآورد تابع بقا پایه برای افراد مستعد و برآورد واریانس پارامترهای رگرسیونی است. در داده‌های بقا انواع مختلف سانسور مانند سانسور از راست، سانسور از چپ، سانسور فاصله‌ای، خارج از کنترل پژوهشگران می‌باشد؛ همین مسئله منجر به تمایز این نوع تحلیل از سایر تحلیل‌های آماری می‌شود و در عین حال تأثیر زیادی در تعیین مدل مناسب برای تحلیل بقا دارد. به شرط وجود درصد قابل قبولی از داده‌های سانسورشده، همواره می‌توان از مدل‌های استاندارد، اعم از مدل‌های ناپارامتری، نیمه‌پارامتری و پارامتری در تحلیل این نوع داده‌ها استفاده کرد. مدل‌های شفایافتگی آمیخته در داده‌هایی که نرخ سانسورشده‌گی در آن‌ها بالاست، مورداستفاده قرار می‌گیرد. مدل‌های شفایافتگی منجر به برآورد بهتر این داده‌ها می‌شود. توزیع‌های آمیخته، به طور سازگاری، شکل‌های انعطاف‌پذیری از تابع‌های چگالی – هنگامی که توزیع‌ها چندحالی و غیرنرمال هستند. فراهم می‌کند (۳۲).

در مدل‌های بقا، فرض بر این است که هر فرد در جامعه موردب Rossi مستعد رخداد موردنظر است و درصورتی که دوره پیگیری بهاندازه کافی طولانی باشد، درنهایت این رخداد را تجربه خواهد کرد. با وجود این، در برخی بیماری‌ها مدارک زیستی محکمی وجود دارد که رخداد هنگام درنظر گرفتن نقطه پایانی، به جز مرگ طبیعی، هیچ‌گاه برای برخی آزمودنی‌ها اتفاق نمی‌افتد. فرض آن‌که برخی افراد هیچ‌گاه رخداد موردنظر را تجربه نمی‌کنند، تنها می‌توان بر ملاحظات تجربی مانند وجود تعداد زیادی از بازماندگان در بلندمدت است. وجود افراد نامستعد (یا ایمن) یا شفایافتیه با توجه به رخداد موردنظر در نمودار تابع توزیع بقا کناری توسط کاپلان مایر<sup>۱</sup> پیشنهاد شد که تراز پایدار و طولانی یا ممتد با سانسورسازی بالا در کران راست نشان داده شد. در سال‌های اخیر،

دوران سالماندان، معمولاً از ۶۵ سالگی شروع می‌شود و با دگرگونی‌های تدریجی در ترکیب و ساخت ارگانیسم و با نزول عملکرد تمام سیستم‌های بدن، همراه است. وجود علائمی مانند گیجی، ضعف و اشکال در راه رفتن و بیماری‌های سیستم عصبی مانند پارکینسون و عوامل محیطی مانند راه رفتن روی سطوح لغزندۀ و قالیچه‌ها، نور کم و موانع می‌توانند فرد را مستعد زمین‌خوردن کنند. استفاده از داروهای خواب‌آور، ضعف عضلات اندام تحتانی و دفورمیتی پاها نیز از عوامل دیگر هستند. سقوط یکی از علل عمده مرگ و میر ناشی از حوادث در سالماندان به شمار می‌رود (۱). براساس گزارش سازمان ملل در سال ۶۲۰۰ م. تعداد کل سالماندان دنیا حدود ۷۰ میلیون نفر برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در ۴۰ سال آینده دو برابر شود. هم‌چنین انتظار می‌رود روند سالماندانشدن جوامع تا ۵۰ سال آینده ادامه یابد و بیماری‌ها و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش یابد (۵-۲). براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ایران در سال ۱۳۹۰ افراد ۶۰ سال و بالاتر ۸/۲۶ درصد و افراد ۶۵ سال و بالاتر ۵/۷۸ درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شوند. در حالی‌که ضریب رشد جمعیت در ایران ۱/۲۹ درصد است، ضریب رشد جمعیت سالماندان ایران حدود ۲/۵ درصد بوده و درنتیجه سرعت سالماندانشدن جمعیت ایران بسیار سریع است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ م. بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایران سالماندان باشند (۶). از طرف دیگر، سالماندان جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند (۷) و حوادث مختلفی آن‌ها را تهدید می‌کند (۸). حادثه سقوط یک مشکل عمده بهداشتی در سالماندان است (۹، ۱۰) و از علل مهم صدمات منجر به مرگ در افراد ۶۵ سال و بالاتر می‌باشد (۱۱، ۱۲). حدود ۴۰ درصد سقوط افراد بالاتر از ۸۵ سال منجر به مرگ می‌شود (۱۳). هزینه مراقبت‌های پزشکی در بیماران سالماندان تروماتیک، به دلیل طولانی‌تر بودن مدت زمان بستری و نیاز به مراقبت‌های ویژه، سه برابر بیماران جوان است (۱۴). بیش‌تر سقوط سالماندان در منازل اتفاق می‌افتد (۱۵، ۱۶). در مطالعات مشخص شد سالماندانی که در منازل تاریک، شلوغ یا نامرت زندگی می‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای در معرض سقوط قرار دارند (۱۷). شکستگی‌ها، تخریب بافت نرم، کبودی و پارگی از عوارض سقوط سالماندان است (۱۸). فراوانی سقوط به طور معنی داری با افزایش سن مرتبط است. آمار نشان داده که سالانه از هر سه سالماندان، یک نفر دچار سقوط می‌شود (۱۹، ۲۰). هم‌چنین نیمی از سالماندان، سقوط مکرر دارند که به خاطر آسیب ناشی از آن، ترس از سقوط، افزایش وابستگی، افسردگی و اضطراب به وجود می‌آید (۲۱). در کشور آمریکا ۱۵/۹ درصد افراد سالماندان، در سه‌ماه، حداقل یکبار سقوط را گزارش کرده‌اند (۲۶). هم‌چنین در مطالعات انجام‌شده، زنان سالماندان بیش‌تر از مردان دچار سقوط شده‌اند (۱۹-۲۷)؛ به همین نسبت، ترس از افتادن در زنان سالماندان، بیش‌تر از مردان وجود داشته است (۲۸، ۲۹). علاوه بر عوامل دموگرافیک، عوامل خطر سقوط به دو دستهٔ داخلی و خارجی (محیطی)

<sup>۱</sup>. Kaplan-Meier

تابع بقا به ترتیب در هر دو بخش رویداد (فوت) و نهفتگی (شفایافتن) تأثیر می‌گذارند (۳۷). دلیل استفاده از نمادهای متغیر برای متغیرهای کمکی آن است که مدل پیشنهادی انعطاف‌پذیر است و می‌توان در هر دو بخش، متغیرهای متفاوتی را در نظر گرفت. در این صورت، مدل شفایافته آمیخته به شکل زیر خواهد بود:

$$S(t|x, z) = \pi(z)S(t|x) + 1 - \pi(z)$$

اگر مدل فوق برای مدل‌سازی قسمت پنهان (شفایافته) به کار برد شود، مدل شفایافته آمیخته، مدل شفایافته آمیخته خطر متناسب نامیده می‌شود. در عوض اگر از مدل زمان شکست شتابی برای توزیع پنهان‌بودن استفاده شود، به آن مدل شفایافته آمیخته زمان شکست شتابیده گفته می‌شود. در این پژوهش از مدل‌های شفایافته آمیخته خطر متناسب (PHMC) نیمه‌پارامتری و مدل شفایافته آمیخته زمان شکست شتابیده (AFTMC) نیمه‌پارامتری برای تحلیل داده‌های سالماندان دارای صدمات ناشی از سقوط استفاده شده است. در مدل PHMC از روش درست‌نمایی جزئی، بدون مشخص کردن تابع خطر پایه، استفاده می‌شود و در مدل AFTMC از روش برآورد رتبه محور برای برآورد پارامترها استفاده می‌گردد. هم‌چنین در هر دو روش ذکر شده نرخ شفایافته و نرخ فوت سالماندان قابل اندازه‌گیری است. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌های شفایافته آمیخته در نرم‌افزار R نسخه ۳-۲-۲ و از بسته SMCURE استفاده گردید. برآورد واریانس متغیرها نیز با استفاده از نمونه خودگردان ۲۰۰ تابی و تابع ربط متمم لوگ-لوگ در بسته SMCURE انجام شد. لازم به ذکر است که هرچه تعداد نمونه‌های خودگران و معیار هم‌گرایی از دقت بالایی برخوردار باشد، زمان اجرای برنامه، بیشتر خواهد شد. مقدار پیش‌فرض معیار هم‌گرایی ۰/۰۰۰۰۰۱ در نظر گرفته شد. خروجی به دست آمده از اجرای برنامه، شامل دو بخش است: مدل احتمال شفایافته و مدل توزیع زمان شکست. برآورد نرخ شفایافته به آسانی با استفاده از فرمول  $\hat{\pi}(z) = 1 - \text{امکان}(\text{آمیخته})$  مدل توزیع شکست، نرخ فوت بیمار با استفاده از  $(z)$  قابل برآورد می‌باشد. نرم‌افزار R برآورد پارامترها را در بخش رویداد با عنوان مدل توزیع زمان شکست (مفهوم آن در این مقاله فوت می‌باشد) و برای بخش نهفتگی با عنوان مدل احتمال شفایافته انجام می‌دهد. جداول ارائه شده نیز از این الگو پیروی می‌کنند.

### ۳ یافته‌ها

از نمونه‌های بررسی شده، ۵۴ نفر از سالماندان (۴۴ درصد)، مرد و ۷۰ نفر (۵۶ درصد) از آن‌ها زن بودند. تعداد ۲۰ نفر (۱۶ درصد) دارای سابقه بیماری قند و ۳۹ نفر (۳۱ درصد) دارای پُرفساری خون و تعداد ۶۴ نفر (۵۲ درصد) دارای صدمه به سروگردان و تعداد ۴۸ نفر (۴۳ درصد)، دارای یک موضع جراحی شده بودند (جدول ۱).

متوسط سن سالماندان  $7/17 \pm 7/19$  سال با میانه سنی ۷۹ سال، متوسط مدت زمان بستری برای سالماندان  $6/98 \pm 4/59$  روز با میانه زمان بستری ۶ روز و میانگین زمان بقای سالماندان دارای سقوط  $72/91 \pm 1123/42$  روز به دست آمد.

توجه زیادی به مدل‌سازی داده‌های بقا با بازماندگان طی بلندمدت وجود دارد. در نظر نگرفتن چنین آزمودنی‌های شفایافته‌ای به بیش برآورده بقای آزمودنی‌های مستعد منجر می‌شود. در مدل‌های شفایافته آمیخته، جامعه موردبررسی، آمیخته‌ای است از افراد مستعد (شفایافته) که ممکن است رخداد موردنظر را تجربه کنند و افراد نامستعد (شفایافته) که هیچ‌گاه دچار رخداد موردنظر نخواهند شد. این موارد در متون تخصصی، میزان بروز یا شیوع<sup>۱</sup> نامیده می‌شود. وقتی رخداد موردنظر رخ می‌دهد، به شرط آن که بتواند رخ بدهد، مرحله نهفتگی<sup>۲</sup> ظاهر می‌شود (۳۱).

مسئله مهم در مدل‌های شفایافته، برآورد تابع خطر پایه برای افراد شفایافته است. در ابتدا توزیع‌های کاملاً پارامتری از جمله نمایی، لگ نرمال، واibil و گامپرلتز (۳۲-۳۵) پیشنهاد شده است. با وجود مدل‌های شفایافته کاملاً پارامتری در تحلیل داده‌های زیستی به اندازه کافی انعطاف‌پذیر نیستند، چون که با فرضیات قوی در مورد تابع بقای بیماران شفایافته سر و کار دارند. رهیافت دیگر، برآورد ناپارامتری تابع بقا افراد شفایافته است و در حوزه مدل‌های شفایافته آمیخته نیمه‌پارامتری قرار می‌گیرد (۳۶).

### ۲ روش بررسی

در این مطالعه، به صورت مقطعی و تمام‌شماری، از داده‌های مربوط به سالماندان بالای ۶۵ سال صدمه‌دیده ناشی از سقوط که با اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافته بودند، استفاده شد. داده‌های موردنیاز با استفاده از نرم‌افزار (HMIS) استخراج گردید و متغیرهای سن، جنسیت، مدت زمان بستری بر حسب روز، سابقه بیماری قند، فشار خون، وضعیت صدمه به سروگردان و تعداد جراحی بررسی شد. پس از محساسبه، دسته‌بندی و گویا کردن کدهای طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD10) و مشخص نمودن متغیرهای مربوط به بیماران، اعم از متغیرهای جمعیت‌شناسی و متغیرهای مربوط به صدمه و نوع تشخیص و عمل جراحی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ نهایی شد.

متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه عبارت بودند از: سن، جنس، مدت زمان بستری بر حسب روز، سابقه بیماری قند، فشار خون، وضعیت صدمه به سروگردان و تعداد مواضع جراحی شده. پس از پیگیری و وضعیت نهایی سالخوردهای سالماندان دارای صدمات ناشی از سقوط در اردیبهشت ماه ۹۴ (به فاصله زمانی حداقل سه سال و حداقل شش سال و دو ماه پس از سقوط)، در کل، ۱۲۴ مشاهده در تحلیل مورداستفاده قرار گرفتند. از زمان بستری تا زمان پیگیری بر حسب روز و به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد. هم‌چنین مطالعه پیگیری در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۲ به پایان رسید.

مدل‌های شفایافته آمیخته نیمه‌پارامتری، یکی از متداول‌ترین مدل‌های برای برآورد نرخ شفایافته و نرخ بقا در بیمارانی است که معالجه نمی‌شوند. در این مدل اگر  $T$ ، زمان شکست موردنظر باشد،  $-1/\pi$  احتمال شفایافتن یک بیمار است که به بستگی دارد و  $S(t|x)$  احتمال بقای بیماران شفایافته، وابسته به  $X$  است که در آن  $X$  و  $Z$  مقادیر مشاهده شده از دو بُردار متغیرهای کمکی هستند که بر

<sup>1</sup>. incidence

<sup>2</sup>. Latency

جدول ۱. توزیع متغیرهای مربوط به سالمندان دارای صدمات ناشی از سقوط.

متغیر	سطوح متغیر	تعداد	درصد
جنس	مرد	۵۴	۴۳/۶
	زن	۷۰	۵۶/۴
دیابت	دارد	۲۰	۱۶/۱
	ندارد	۱۰۴	۸۳/۹
پُرفشاری خون	دارد	۳۹	۳۱/۴
	ندارد	۸۵	۶۸/۶
صدمه به سرو گردن	دارد	۶۴	۵۱/۶
	ندارد	۶۰	۴۸/۴
تعداد مواضع جراحی شده	ندارد	۴۸	۳۸/۷
	یک مورد	۵۳	۴۲/۷
وضعیت بقا	دو مورد و بیشتر	۲۳	۱۸/۶
	در قید حیات	۶۳	۵۰/۸
	فوت شده	۶۱	۴۹/۲

جدول (۲) حاصل بازش مدل چندمتغیره خطر متناسب شفایافته تأثیرگذار است و سایر متغیرها بر شفایافتگی تأثیری ندارند. در بخش آمیخته نیمهپارامتری برای هر دو بخش سالمندان شفایافته و فوت شده مدل توزیع زمان شکست نیز متغیر سن ( $p_{age} = 0/020$ ,  $p = 0/038$ ) دارای سقوط با هفت متغیر کمکی است. همان طور که مشاهده می شود تنها متغیر سن (۱۳,  $p = 0/041$ ,  $p_{age} = 0/041$ ) بر احتمال شفایافتگی

جدول ۲. نتایج برآورد پارامترها برای مدل چندمتغیره خطر متناسب شفایافته آمیخته نیمهپارامتری.

متغیر	برآورد پارامتر	انحراف استاندارد	آماره Z	مقدار احتمال	مدل احتمال شفایافتگی
سن	-۰/۰۴۱	-۰/۰۱۷	-۲/۴۷۸	-۰/۰۱۳	
جنسیت	-۰/۰۱۳۹	۰/۱۹۵	-۰/۷۱۲	-۰/۴۷۶	
پُرفشاری خون	-۰/۰۳۹	۰/۲۴۶	-۰/۱۶۱	-۰/۸۷۲	
دیابت	-۰/۰۲۱۵	۰/۳۵۲	-۰/۶۱۱	-۰/۵۴۱	
تعداد جراحی	۰/۰۴۱	۰/۱۹۴	۰/۲۱۳	۰/۸۳۱	
صدمه به سرو گردن	-۰/۰۲۷۶	۰/۲۳۷	-۱/۱۶۶	-۰/۲۴۳	
مدت زمان بستری	-۰/۰۰۴۱	۰/۰۲۹	-۱/۳۸۹	-۰/۱۶۵	

  

متغیر	برآورد پارامتر	انحراف استاندارد	آماره Z	مقدار احتمال	مدل توزیع زمان شکست
سن	۰/۰۲۰	۰/۰۲۳	۰/۸۷۸	۰/۰۳۸	
جنسیت	۰/۱۹۴	۰/۰۲۹	۰/۶۶۸	۰/۰۵۰۴	
پُرفشاری خون	۰/۱۷۳	۰/۰۵۰	۰/۳۴۵	۰/۰۷۳۰	
دیابت	-۰/۰۲۹۸	۰/۴۴۴	-۰/۶۷۲	-۰/۰۵۰۱	
تعداد جراحی	۰/۰۳۲۷	۰/۰۲۶۱	۱/۲۸۷	۰/۱۹۸	
صدمه به سرو گردن	-۰/۰۵۳۴	۰/۰۳۳۰	-۱/۶۱۷	-۰/۱۰۵	
مدت زمان بستری	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۴۴	-۰/۰۲۷۵	-۰/۷۸۲	

جدول (۳) نتایج برآورد پارامترها را برای مدل شفایافته آمیخته زمان و سایر متغیرها بر شفایافتگی تأثیری ندارند. برای فوت شدگان، متغیر شکست شتابی در هر دو بخش سالمندان شفایافته و فوت شده دارای صدمه به سرو گردن ( $p = 0/031$ ) و دیابتی بودن ( $p = 0/080$ ) بر سقوط با هفت متغیر کمکی، نشان می دهد. همان طور که مشاهده برآش مدل فوق از تابع ربط متمم لوگ-لوگ استفاده شده است، نرخ می شود، متغیر سن بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار است ( $p = 0/016$ )

همچنین نرخ فوت برای سالخوردگانی که دیابتی هستند، ۶۹ درصد و آنها بیکاری که فاقد این بیماری هستند، ۶۳ درصد است.

شفایافتگی برای مردان سالخورده به صورت  $\pi = \exp(-\exp(z))$  یا به عبارت دیگر  $\pi = 0.3822 / 0.3849$  ۳۸٪ درصد و برای زنان سالخورده، ۳۶٪ درصد به دست آمد.

جدول ۳. نتایج برآورده پارامترها برای مدل چندمتغیره زمان شکست شتابی شفایافتگی نیمهپارامتری.

مدل احتمال شفایافتگی					
متغیر	برآورده پارامتر	انحراف استاندارد	آماره Z	مقدار احتمال	مدل توزیع زمان شکست
سن	-0.039	0.016	-2.395	-0.016	مدل توزیع زمان شکست
جنسیت	-0.041	0.014	-0.660	0.0508	برآورده پارامتر
پُرفشاری خون	-0.053	0.022	-0.238	0.0811	انحراف استاندارد
دیابت	-0.020	0.030	-0.674	0.0500	آماره Z
تعداد جراحی	0.036	0.186	0.194	0.0846	مقدار احتمال
صدمه به سروگردان	-0.0265	0.215	-1.233	0.217	مودل زمان بستری
مدت زمان بستری	-0.039	0.030	-1.293	0.196	

  

مدل احتمال شفایافتگی					
متغیر	برآورده پارامتر	انحراف استاندارد	آماره Z	مقدار احتمال	مدل توزیع زمان شکست
سن	-0.010	0.004	-0.237	0.812	مدل توزیع زمان شکست
جنسیت	-0.023	0.066	-0.351	0.724	برآورده پارامتر
پُرفشاری خون	-0.072	0.097	-0.752	0.451	انحراف استاندارد
دیابت	0.155	0.089	0.749	0.080	آماره Z
تعداد جراحی	-0.061	0.053	-1.103	0.248	مقدار احتمال
صدمه به سروگردان	0.165	0.076	2.156	0.031	مودل زمان بستری
مدت زمان بستری	0.008	0.008	0.984	0.324	

را کاهش داد. همچنین با کنترل تغذیه سالم‌مندان می‌توان آسیب‌های ناشی از بیماری‌هایی مانند قند را به حداقل رساند.

مدلهای خطر متناسب و زمان شکست شتابی برای مجموعه داده‌های مختلف برآورده شده است که در ادامه نتایج به کارگیری این مدل‌ها با نتایج مطالعه حاضر مقایسه می‌شود. در مطالعات مشابه، بیشتر، مقایسه روش‌های شفایافتگی مدنظر پژوهشگران بوده است. چانوکاری و همکاران (۲۰۱۲) ابتدا مدل نیمهپارامتری خطر متناسب شفایافتگی آمیخته را به داده‌های سرطان پوست حاصل از مرحله سوم آزمایش‌های بالینی<sup>۱</sup> ECOG برآورده دادند. هدف از این آزمایش، ارزیابی دوز همکاران (۳۲) مدل‌های شفایافتگی آمیخته پارامتری و نیمهپارامتری را به این داده‌ها برآورده بودند. هدف از این آزمایش، ارزیابی دوز بالای ایتریفیون آلفای ۲ (IFN) در برابر دارونما (به عنوان شفایافتگی کمکی) پس از عمل بود. پس از حذف مشاهدات گم شده، تعداد مشاهده در تحلیل به کار رفتند. متغیرهای تیمار، جنسیت و سن در هر دو بخش رویداد و نهفته‌گی بدون بازگشت (عود) بیماری بر حسب سال پاسخ، مدت زمان زندگی بدون بازگشت (عود) بیماری بر حسب سال بود. خطای استاندارد پارامترهای برآورده شده با ۵۰۰ نمونه خودگران، ربط لوچیت و روش خطر متناسب محاسبه شد. بررسی آن‌ها نشان داد که متغیرهای سن ( $p=0.15$ ) و TRT ( $p=0.05$ ) از نظر آماری معنی‌دار و درنتیجه بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار هستند. البته مطالعه

خدمات ناشی از سقوط سالم‌مندان به دلیل امکان بهبودی نسبی و کامل پس از سقوط می‌تواند در قالب مدل‌های شفایافتگی بررسی شود. در این مقاله برای اولین‌بار از روش خطر متناسب و زمان شکست شتابی مدل‌های شفایافتگی آمیخته نیمهپارامتری در داده‌های سقوط سالخوردگان استفاده کردیم. بخش احتمال شفایافتگی را با استفاده از مدل‌های خطی برآورد کردیم که در آن امکان استفاده از توابع ربط مختلف مانند لوچیت، پروبیت و متمم لوگ-لوگ فراهم شده است. بخش نهفته‌گی می‌تواند از مدل خطر متناسب یا از مدل زمان شکست شتابی پیروی کند. برآورش مدل خطر متناسب چندمتغیره نشان داد که از بین متغیرهای کمکی، تنها متغیر سن بر احتمال شفایافتگی ( $p=0.13$ ) و فوت ( $p=0.38$ ) تأثیرگذار است و سایر متغیرها بر شفایافتگی تاثیری ندارند. برآورش مدل چندمتغیره بهروش زمان شکست شتابیده، نشان داد که از بین متغیرهای کمکی، متغیر سن بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار است ( $p=0.16$ ) و سایر متغیرها بر شفایافتگی تاثیری ندارند. متغیر صدمه به سروگردان ( $p=0.31$ ) و دیاب (۰.۸۰) بر احتمال فوت تأثیرگذار بود.

با توجه به اینکه صدمه به سروگردان یکی از عوامل مؤثر بر فوت سالخوردگان دارای خدمات ناشی از سقوط بوده است، به نظر می‌رسد با بهبود شرایط مکانی زندگی سالم‌مندان می‌توان آسیب‌های ناشی از سقوط

#### ۴ بحث

<sup>1</sup>. Eastern Cooperative Oncology Group

بیمار، بیشتر است؛ زیرا ضریب متغیر فوق در بخش شفایافتگی معنی دار شد ( $p=0.03$ ) (۳۹).

## ۵ نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه صدمه به سروگردن یکی از عوامل مؤثر بر فوت سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط بوده است، به نظر می‌رسد با بهبود شرایط مکان زندگی سالم‌مند، می‌توان آسیب‌های ناشی از سقوط را کاهش داد.علاوه‌بر این، با کنترل تغذیه سالم‌مندان می‌توان آسیب‌های ناشی از بیماری‌هایی مانند قدر را به حداقل رساند. هم‌چنین هر دو روش شفایافتگی آمیخته خطر متناسب و روش زمان شکست شتابیده قادر به برآوردن پارامترهای مدل شفایافتگی آمیخته نیمه‌پارامتری داده‌های سالخوردگان ناشی از سقوط است.

حاضر نیز نشان داده که متغیر سن در روش خطر متناسب بر شفایافتگی سالخوردگان تأثیرگذار است که با نتیجه این مطالعه هم‌خوانی دارد.

چائوکای و همکاران (۲۰۱۲) مدل نیمه‌پارامتری AFTMC را در مطالعه پیوند مغز استخوان بیماران مبتلا به سلطان خون لنفوسيت حاد صعب‌العلاج برازش دادند. این مجموعه‌داده به طور وسیعی در مدل AFTMC مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا فرض خطر متناسب برای مؤلفه نهفتگی مناسب نیست. ۴۶ بیمار به روش دگر زاد، و ۴۴ بیمار به روش پیوند از بدن خود، موردمعالجه قرار گرفتند. متغیر روش شفایافتگی در هر دو بخش رویداد و نهفتگی گنجانده شد (یک برای گروه معالجه به روش دگر زا و صفر برای گروه معالجه به روش پیوند از بدن خود). نتایج برازش مدل نشان داد که احتمال بقای گروه معالجه به روش دگر زا در مقایسه با گروه معالجه، به روش پیوند از بدن خود

## References

- Shokoohi S, Babanejad M, Behzadifar M, Delpisheh A. Study of Health and Disease Status in Elderly people of Ilam Province. *sjimu medilam*. 2013; 21 (6): 276–286. [Persian] [\[Link\]](#)
- Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. *The Lancet*. 2002; 359 (9319): 1761–1767. [\[Link\]](#)
- Wolfe RR, Jordan D, Wolfe ML. The WalkAbout: A new solution for preventing falls in the elderly and disabled. *Archives of physical medicine and rehabilitation*. 2004; 85 (12): 2067–2069. [\[Link\]](#)
- Ungar A, Rafanelli M, Iacomelli I, Brunetti MA, Ceccofoglio A, Tesi F, et al. Fall prevention in the elderly. *Clinical Cases in mineral and bone metabolism*. 2013; 10 (2): 91. [\[Link\]](#)
- Stevens JA, Phelan EA. Development of STEADI: a fall prevention resource for health care providers. *Health promotion practice*. 2013; 14 (5): 706–714. [\[Link\]](#)
- IRANSCo. Abstract of Census 2012. Tehran, Iran: Deputy Director of Strategic Planning and Control of Information and Communications, 2012. [\[Link\]](#)
- Gnanadesigan N, Saliba D, Roth CP, Solomon DH, Chang JT, Schnelle J, et al. The quality of care provided to vulnerable older community-based patients with urinary incontinence. *Journal of the American Medical Directors Association*. 2004; 5 (3): 141–146. [\[Link\]](#)
- Acimis NM, Mas N, Yazici AC, Gocmen L, Isik T, Mas MR. Accidents of the elderly living in Kocaeli Region (Turkey). *Archives of gerontology and geriatrics*. 2009; 49 (2): 220–223. [\[Link\]](#)
- Schwab CW, Shapiro MB, Kauder DR. Geriatric trauma: patterns, care and outcomes. *Trauma*. 2000; 35: 1099–1114. [\[Link\]](#)
- Van Haastregt JC, van Rossum E, Diederiks JP, Voorhoeve PM, de Witte LP, Crebolder HF. Preventing falls and mobility problems in community-dwelling elders: the process of creating a new intervention. *Geriatric Nursing*. 2000; 21 (6): 309–314. [\[Link\]](#)
- Stevens JA. Falls among older adults-risk factors and prevention strategies. *Journal of safety research*. 2005; 36 (4): 409–411. [\[Link\]](#)
- Stevens JA, Olson S. Reducing falls and resulting hip fractures among older women. *Home care provider*. 2000; 5 (4): 134–141. [\[Link\]](#)
- Kerzman H, Chetrit A, Brin L, Toren O. Characteristics of falls in hospitalized patients. *Journal of advanced nursing*. 2004; 47 (2): 223–229. [\[Link\]](#)
- Ghodsi SM, Roudsari BS, Abdollahi M, Shadman M. Fall-related injuries in the elderly in Tehran. *Injury*. 2003; 34 (11): 809–814. [Persian] [\[Link\]](#)
- Easton A, Deborah A, Shipkin OTR, Hummell O. Fall prevention and home safety: The role of the home healthprofessional. [\[Link\]](#)
- Formiga F, Navarro M, Duaso E, Chivite D, Ruiz D, Perez-Castejon JM, et al. Factors associated with hip fracture-related falls among patients with a history of recurrent falling. *Bone*. 2008 Nov; 43 (5): 941–944. [\[Link\]](#)
- Huang H-C. A checklist for assessing the risk of falls among the elderly. *Journal of Nursing Research*. 2004; 12 (2): 131–142. [\[Link\]](#)
- Halil M, Ulger Z, Cankurtaran M, Shorbagi A, Yavuz BB, Dede D, et al. Falls and the elderly: Is there any difference in the developing world?: A cross-sectional study from Turkey. *Archives of gerontology and geriatrics*. 2006; 43 (3): 351–359. [\[Link\]](#)
- Coimbra AMV, Ricci NA, Coimbra IB, Costallat LTL. Falls in the elderly of the family health program. *Archives of gerontology and geriatrics*. 2010; 51 (3): 317–322. [\[Link\]](#)
- Akyol AD. Falls in the elderly: what can be done? *International nursing review*. 2007; 54 (2): 191–196. [\[Link\]](#)
- Salkeld G, Ameratunga SN, Cameron ID, Cumming RG, Easter S, Seymour J, et al. Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women: a time trade off studyCommentary: Older people's perspectives on life after hip fractures. *Bmj*. 2000; 320 (7231): 341–346. [\[Link\]](#)
- Suzuki T. Fall risk and fracture. *Fall risk assessment*. *Clinical calcium*. 2013; 23 (5): 661–667. [\[Link\]](#)
- Newman AB, Murabito JM. The epidemiology of longevity and exceptional survival. *Epidemiologic reviews*. 2013; 35 (1): 181–197. [\[Link\]](#)
- Clouston SA, Brewster P, Kuh D, Richards M, Cooper R, Hardy R, et al. The dynamic relationship between physical function and cognition in longitudinal aging cohorts. *Epidemiologic reviews*. 2013; 35 (1): 33–50. [\[Link\]](#)
- Balzer K, Bremer M, Schramm S, Lühmann D, Raspe H. Falls prevention for the elderly. *GMS health technology assessment [Internet]*. 2012; 8. [\[Link\]](#)

26. Stevens JA, Mack KA, Paulozzi LJ, Ballesteros MF. Self-reported falls and fall-related injuries among persons aged $\geq$  65 years—United States, 2006. *Journal of safety research*. 2008; 39 (3): 345–349. [[Link](#)]
27. Lehtola S, Koistinen P, Luukinen H. Falls and injurious falls late in home-dwelling life. *Archives of gerontology and geriatrics*. 2006; 42 (2): 217–224. [[Link](#)]
28. Nkodo MY, De Breucker S, Delvaux N, Pepersack T. Fear of falling in older people. *Revue medicale de Bruxelles*. 2006; 28 (1): 27–31. [[Link](#)]
29. Chang N-T, Chi L-Y, Yang N-P, Chou P. The impact of falls and fear of falling on health-related quality of life in Taiwanese elderly. *Journal of community health nursing*. 2010; 27 (2): 84–95. [[Link](#)]
30. Tromp AM, Pluijm SMF, Smit JH, Deeg DJH, Bouter LM, Lips P. Fall-risk screening test: a prospective study on predictors for falls in community-dwelling elderly. *Journal of clinical epidemiology*. 2001; 54 (8): 837–844. [[Link](#)]
31. Corbière F, Commenges D, Taylor JM, Joly P. A penalized likelihood approach for mixture cure models. *Statistics in medicine*. 2009; 28 (3): 510–524. [[Link](#)]
32. Taylor JM. Semi-parametric estimation in failure time mixture models. *Biometrics*. 1995; 899–907. [[Link](#)]
33. Shao Q, Zhou X. A new parametric model for survival data with long-term survivors. *Statistics in medicine*. 2004; 23 (22): 3525–3543. [[Link](#)]
34. Farewell VT. The use of mixture models for the analysis of survival data with long-term survivors. *Biometrics*. 1982; 38 (4): 1041–1046. [[Link](#)]
35. Gordon NH. Application of the theory of finite mixtures for the estimation of ‘cure’ rates of treated cancer patients. *Statistics in Medicine*. 1990; 9 (4): 397–407. [[Link](#)]
36. Peng Y, Dear KB. A nonparametric mixture model for cure rate estimation. *Biometrics*. 2000; 56 (1): 237–243. [[Link](#)]
37. Cai C, Zou Y, Peng Y, Zhang J. smcure: An R-Package for estimating semiparametric mixture cure models. *Computer methods and programs in biomedicine*. 2012; 108 (3): 1255–1260. [[Link](#)]
38. Kirkwood JM, Strawderman MH, Ernstoff MS, Smith TJ, Borden EC, Blum RH. Interferon alfa-2b adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: the Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST 1684. *Journal of clinical oncology*. 1996; 14 (1): 7–17. [[Link](#)]
39. Zhang J, Peng Y. A new estimation method for the semiparametric accelerated failure time mixture cure model. *Statistics in medicine*. 2007; 26 (16): 3157–3171. [[Link](#)]